

(作物群登録) 花き類(草本植物)・観葉植物への登録農薬一覧

薬剤名	希釈倍数 (使用量)	使用時期	使用回数	適用害虫名										人畜毒性			
				アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	アオムシ	ヨトウムシ類	ハマキムシ類	ハモグリバエ類	オオタバコガ	バッタ類	ハダニ類		チャノホコリダニ		
アフーム乳剤	1,000	発生初期	5														
アクタラ顆粒水溶剤	2,000		6														
アドマイヤーフロアブル	2,000	発生初期	5														
アディオソ乳剤	2,000	発生初期	6														
オルトラン水和剤	1,000-1,500	発生初期	5														
〃	1,000	発生初期	5														
オルトラン粒剤	(3-6kg/10a)	発生初期	5														
〃	(6kg/10a)	発生初期	5														
〃 (家庭園芸用)	(3-6g/m ²)	発生初期	5														
〃 (家庭園芸用)	(6g/m ²)	発生初期	5														
カルホス乳剤 *	1,000		4		*												劇
コテツフロアブル	2,000	発生初期	2														劇
スプラサイド乳剤40	1,000	発生初期	5		*												劇
〃 水和剤	1,000	発生初期	6		*												劇
スミチオン乳剤50	1,000		6														
ディブテックス乳剤	1,000		6														劇
チェス水和剤	3,000		4														
マラソン乳剤50	2,000	発生初期	6														
〃 (家庭園芸用)	2,000	発生初期	6														
ノーモルト乳剤	2,000	発生初期	2														
ベストガード水溶剤	1,000	発生初期	4														
ベストガード粒剤	(1-2g/株)	発生初期	4														
ラーピンフロアブル	750		6														
ケルセン乳剤40	1,000-2,000	発生初期	2														
〃 水和剤33	1,500	発生初期	2														
粘着くん液剤	100	発生初期															
ニツラン水和剤	2,000-3,000		2														
ピラニカEW	2,000	発生初期	1														
ロディー乳剤	1,000		6														劇

* カルホス乳剤は、シクラメン、アジアンタムを除く、オンシツコナジラミ若齢幼虫に適用

* スプラサイド乳剤、水和剤は、オンシツコナジラミに適用

薬剤名	希釈倍数 (使用量)	使用時期	使用回数	適用病害名										人畜毒性			
				灰色かび病	うどんこ病	黒班病	菌核病	立枯病	苗立枯病	球根腐敗病	青枯病	半身萎凋病・萎凋病	白絹病		疫病		
サンヨール	500		8														
カリグリーン	800	発病初期	8														
ポリオキシシAL水溶剤	2,500	発病初期	5														
ポリベリン水和剤	1,000		5														
ゲッター水和剤	1,000		5														
モレスタン水和剤	2,000-3,000																
フルピカフロアブル	2,000-3,000	発病初期	5														
トップジンM水和剤	1,500		3														
オーソサイド/キャプタン水和剤	600																
ガスタード/バスアミド微粒剤	(20-30kg/10a)	植付前	1														劇
ドジョウビクリン、ドクロロール	(2-3ml/穴)	植付前	1														劇
リゾレックス粉剤	(50kg/10a)	定植前	1														
〃 水和剤	500-1,000	生育期	5														
リドミル粒剤2	(20kg/10a)	定植・生育時	3														

(注)作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用すること。