芝病害適用農薬一覧(殺菌剤・1)

| 商品名 | 有効成分名(%) | 安全性 | | | | | 適用病害 | | | | |

芝病害適用農薬一覧(殺菌剤・2)

商品名	有効成分名(%)	安全性					適用病害																														
							日本芝											西洋芝(ベントグラス)																				
		人畜毒性	魚毒性	水質指針設定	PRTR対象	本剤の使用回数	さび病	ヘルミントスポリウム葉枯病	カーブラリア葉枯病	フェアリーリング病	葉腐病(ラージパッチ)	擬似葉腐病(春はげ症)	擬似葉腐病(象の足跡)	雪腐病	立枯病(ゾイシアデクライン)	さび病	ヘルミントスポリウム葉枯病	カーブラリア葉枯病	フェアリーリング病	葉腐病(ブラウンパッチ)	擬似葉腐病(イエローパッチ)	赤焼病	ピシウム病	雪腐病	紅色雪腐病	雪腐褐色小粒菌核病	雪腐小粒菌核病	ダラースポット病	立枯病(テイクオールパッチ)	炭疽病
ティービック水和剤	チウラム(40.0)、ペンシクロン(20.0)	普	C	*	*	4					●									●																	
テンホープ水和剤	フルトラニル(25.0)、プロピコナゾール(2.0)	普	B	*		4		●	●		●	●	●				●	●		●						●	●									
ドウグリン水和剤	8-ヒドロキシキノリン(80.0)	普	C	*	*	3		●	●								●	●		●				●		●		●								
トップグラスドライフロアブル	チオファネートメチル(70.0)	普	A			8		●	●		●	●	●				●	●		●	●						●	●	●							
トップティ水和剤	チオファネートメチル(45.0)、トリフミゾール(15.0)	普	B			8	●	●	●		●						●	●		●							●	●	●							
トルファン	バリダマイシンA(5.0)、フェリムゾン(30.0)	普	A		*	8		●	●		●						●	●		●		●					●									
バイコラール水和剤	ビテルタノール(25.0)	普	B		*	6		●									●										●									
バイレトン水和剤25	トリアジメホン(25.0)	普	B			5	●									●																				
バイレトン乳剤	トリアジメホン(20.0)	普	B			5	●									●																				
バシバッチ水和剤	プロピコナゾール(4.0)、メプロニル(50.0)	普	B	*		4		●			●	●	●							●							●	●	●	●						
バッチコロン水和剤	シメコナゾール(20.0)	普	A			8					●	●								●								●								
バナーマックス液剤	プロピコナゾール(13.0)	普	B	*		3		●	●								●	●						●				●								●
バリダシン液剤5	バリダマイシンA(5.0)	普	A			8					●									●																
ブラウザー水和剤	フルトラニル(25.0)、プロピコナゾール(2.0)、メタラキシル(3.0)	普	B	*		3		●	●				●				●	●		●		●					プ○	●							
ブルーデンス水和剤	イプロジオン(17.0)、ホセチル(40.0)	普	A	*		6		●					●	●						●	●	●	●					●								
プレビクールN液剤	プロハモカルブ(64.0)	普	A			8																●														
ヘリテージ顆粒水和剤	アゾキシストロビン(47.0)	普	B	*		8				●	●	●			●				●	●		●	●		●											
ベンレート水和剤	ベノミル(50.0)	普	B		*	6														●																
ベンレートT水和剤20	チウラム(20.0)、ベノミル(20.0)	普	C	*	*	6		●			●						パ●			●																
ホーマイ水和剤	チウラム(30.0)、チオファネートメチル(50.0)	普	C	*	*	8		●					●				●			●																
ボディーブロー水和剤	イミノクタジンアルベシル酸塩(15.0)、ホリオキシン(5.6)	普	A			6		●	●											●								●							
ポリオキシンZ水和剤	ホリオキシンD亜鉛塩(2.25)	普	A			6		●	●	●	●	●					●	●	●	●															
ポリオキシンZドライフロアブル	ホリオキシンD亜鉛塩(2.25)	普	A			6		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●															
ポンジョルノ乳剤	テトラコナゾール(25.0)	普	B			6		●	●								●	●										●	●	●					
マネージ乳剤	イミベンコナゾール(5.0)	普	B		*	6	●	●	●								●	●										●							
ミックレート水和剤	ヒドロキシイソキサゾール(25.0)、プロピコナゾール(12.5)	普	B	*		6												●						●			●							
モノタジンフロアブル	イミノクタジン酢酸塩(5.0)、メプロニル(40.0)	普	B	*	*	8		●			●	●	●				パ●			●					プ●		プ●	プ●							
有機銅80(有機銅水和剤80)	有機銅(80.0)	普	C	*	*	3								●										＊●											
ラリー水和剤	ミクロブタニル(10.0)	普	B			5	●	●									パ●											プ●							
ラリー乳剤	ミクロブタニル(25.0)	普	B			5	●																												
ロブグラン水和剤	イプロジオン(37.5)、トルクロホスメチル(25.0)	普	A	*		3																		●			●							
ロブドー水和剤	イプロジオン(16.5)、有機銅(34.0)	普	C	*	*	5		●									パ●			●							●							
ロブラール水和剤	イプロジオン(50.0)	普	A	*		8		●			●						●			●								●							
ロブラールフロアブル	イプロジオン(23.0)	普	A	*		8		●			●	●	●				パ○			●	●				プラ●	ラ○	プラ●								
ワンオン水和剤	チオファネートメチル(45.0)、バリダマイシンA(5.0)	普	A			6					●						パ●			●								●							

注)魚毒性の表示(A,B,C)は、主成分(原体)でのランク表示である。

注1)西洋芝において、○印はベントグラス以外の芝草種にのみ適用登録があることを示す。
注2)●印または○印につけたカタカナは以下の芝草種に対して適用登録があることを示す。
パ:パミューダグラス　ブ:ブルーグラス　ラ:ライグラス　＊全芝草種