

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年2月27日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第3233号	ディプレックス乳剤	DEP乳剤	ユーピーエルジャパン株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「稲」、「みかん」、「りんご」、「かき」、「なし」、「ぶどう」、「キイチフルーツ」、「くり」、「メロン」、「まくわうり」、「すいか」、「かぼちゃ」、「いちご」、「なす」、「きゅうり」、「だいこん」、「かぶ」、「カリフラワー」、「はくさい」、「キャベツ」、「畑わさび」、「わさび」、「にんじん」、「ばれいしょ」、「かんしょ」、「かんしょ（茎葉）」、「てんさい」、「とうき」、「食用へちま」、「みずいも」、「茶」、「たばこ」、「いね科牧草」、「まめ科牧草」、「いちょう（種子）」を削除する。
- ・作物名「桑」、「まつ」の使用方法「空中散布」を削除する。
- ・作物名「カーネーション」の適用病害虫名「アオムシ」「コナガ」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DEPを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ第1世代	700倍	—	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	ニカメイチュウ第2世代 カキメイチュウ第3世代	500倍					
	フタトゲカヤク	2000倍					
	イネトムシ、イネトノオムシ ウンカ類、アワヨトウ	1000倍					
	カメムシ類	500～1000倍					
	イネヒハメグサリハエ	700～1000倍					
みかん	カメムシ類	800～1000倍		収穫30日前まで	5回以内		5回以内
りんご	ハマキムシ類、マイマイガ	1000～1200倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
かき	カメムシ類、イガ類、ミノガ類	1000倍		収穫7日前まで	5回以内		5回以内
なし	ハマキムシ類	500～1000倍		収穫30日前まで	2回以内		2回以内
ぶどう	コガネムシ類成虫	1000倍	収穫60日前まで	4回以内	4回以内		
キイチフルーツ	カメムシ類、コガネムシ類 ハマキムシ類、ミノガ類		裂果前	5回以内	5回以内		
くり	モモノゴマダラノメガ	500倍	収穫前日まで	4回以内	4回以内		
メロン	ウリハムシ成虫	800～1000倍	—	—	—	—	
まくわうり	アブラムシ類	500～1000倍					

（次頁に続く）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DEPを含む農薬の総使用回数
すいか かぼちゃ	ウリハムシ成虫	800～1000倍	—	収穫7日前まで	6回以内	散布	6回以内
	アブラムシ類	500～1000倍		移植活着後 (仮植床)	3回以内		
いちご	トウモロコシイモムシ幼虫	1000倍				収穫30日前まで	3回以内
	アブラムシ類	500～1000倍					
	イチゴメセンチュウ	500倍					
なす	テントウムシダマシ類 ヨトウムシ、アブラムシ類	1000倍		収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり	ウリハムシ成虫、アブラムシ類						
だいこん	コガ、ヨトウムシ、アオムシ キスジノミハムシ成虫	1000倍		収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内
	ハイマダラノメカ	800～1000倍					
	アブラムシ類	500～1000倍					
かぶ	コガ、ヨトウムシ、アオムシ キスジノミハムシ成虫 ハイマダラノメカ アブラムシ類	1000倍		収穫21日前まで	1回	散布	1回
カリフラワー				2回以内	2回以内		
はくさい	コガ、ヨトウムシ、アオムシ キスジノミハムシ成虫	800～1000倍 500～1000倍		収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	ハイマダラノメカ						
	アブラムシ類						
キャベツ	コガ、ヨトウムシ、アオムシ キスジノミハムシ成虫	1000倍		収穫30日前まで	6回以内	散布	6回以内
	ハイマダラノメカ	800～1000倍					
	アブラムシ類	500～1000倍					
畑わさび わさび	カブラハバチ、アオムシ コガ、ヨトウムシ	1000倍		収穫30日前まで 畑育苗期	2回以内	散布	2回以内
にんじん	キアゲハ幼虫	800～1000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内 (粒剤は2回以内)
ばれいしょ	テントウムシダマシ、ヨトウムシ	1000倍		収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内
	アブラムシ類	500～1000倍					
かんしょ	ナジロシタハ ハスモンヨトウ、イトコガ	700～1000倍		収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
	アキロウトコガネ成虫	500倍					
かんしょ (茎葉)	ナジロシタハ	1000倍		収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
てんさい	ハスモンヨトウ ヨトウムシ	500～700倍		収穫14日前まで	6回以内		6回以内
とうき	キアゲハ	2000倍		収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
食用へちま	ヒメクロウリハムシ	1000倍		収穫7日前まで			
みずいも	ハスモンヨトウ			1000倍	収穫14日前まで	2回以内	散布
茶	コカクモハマキ チャドクガ、チャノホリガ						
たばこ	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ タバコアオムシ	500倍		—	—	散布	—
いね科牧草	アヲヨトウ						
まめ科牧草	ハスモンヨトウ、ゾウムシ類	500倍	収穫45日前まで	4回以内	散布	4回以内	
カーネーション	アオムシ、コガ ハメグサノミ、ヨトウムシ類	1000倍	発生初期	6回以内		6回以内	
いちよう (種子)	クスン		1000倍	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	

(次頁に続く)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DEPを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ、フタオビコヤカ、 イトムシ、ウカ類 アヲヨウ、カメムシ類 イトノオイムシ イトヒメクワリバエ	20倍	3～4 L/10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	空中散布	4 回以内
	カメムシ類	5倍	0.8 L/10a			無人ヘリコプター による散布	
くり	モモノコマダラノメイガ	10倍	3 L/10a	裂果前	5回以内	空中散布	5回以内
桑	クワノメイガ	50倍	3～4 L/10a	摘採 14 日前まで	—		空中散布
	アメリカシロヒトリ	10倍	0.8 L/10a				
	ハコノモ類	6倍					
まつ	マツカレハ	60倍	6 L/10a	幼虫期			

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DEPを含む農薬の総使用回数
カーネーション	ハメグワリバエ類、イトムシ類	1000倍	-	発生初期	6回以内	散布	6回以内

【変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
柴田、平林

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774