

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成25年6月26日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号    | 農薬名（商品名） | 農薬の種類名  | 製造者名        |
|---------|----------|---------|-------------|
| 第19456号 | バイデートL粒剤 | オキサミル粒剤 | 宇都宮化成工業株式会社 |
| 第19457号 | バイデートL粒剤 | オキサミル粒剤 | ホクサン株式会社    |

### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・「きゅうり」の使用時期「は種前又は定植前」における本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」へ変更する。
- ・「すいか」の使用時期「は種前又は定植前」における本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」へ変更する。
- ・「きゅうり」及び「すいか」のオキサミルを含む農薬の総使用回数を「2回以内（育苗期の株元処理は1回以内）」から「1回」へ変更する。

#### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

##### [変更前]

別紙のとおり

##### [変更後]

別紙のとおり

#### 【変更理由】

登録内容の登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

## 【変更前】

| 作物名  | 適用病害虫名                | 使用量          | 使用時期         | 本剤の使用回数 | 使用方法       | オキサミルを含む農薬の総使用回数                |
|------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|---------------------------------|
| きゅうり | ネオブセンチュウ<br>ネグサレセンチュウ | 25～50 kg/10a | は種前又は<br>定植前 | 2回以内    | 全面土壌<br>混和 | 2回以内<br>(育苗期の<br>株元処理は<br>1回以内) |
|      | アブラムシ類                | 1～2.5g/株     | 定植前          | 1回      | 株元処理       |                                 |
|      | ミナミキロアサミマ             |              | 育苗期          |         |            |                                 |
| すいか  | ネオブセンチュウ<br>ネグサレセンチュウ | 25～35 kg/10a | は種前又は<br>定植前 | 2回以内    | 全面土壌<br>混和 |                                 |
|      | ミナミキロアサミマ             | 1～2.5g/株     | 育苗期          | 1回      | 株元処理       |                                 |
|      | アブラムシ類                | 1.5～2.5g/株   |              |         |            |                                 |

## 【変更後】

| 作物名  | 適用病害虫名                | 使用量          | 使用時期         | 本剤の使用回数 | 使用方法       | オキサミルを含む農薬の総使用回数 |
|------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|------------------|
| きゅうり | ネオブセンチュウ<br>ネグサレセンチュウ | 25～50 kg/10a | は種前又は<br>定植前 | 1回      | 全面土壌<br>混和 | 1回               |
|      | アブラムシ類                | 1～2.5g/株     | 定植前          |         | 株元処理       |                  |
|      | ミナミキロアサミマ             |              | 育苗期          |         |            |                  |
| すいか  | ネオブセンチュウ<br>ネグサレセンチュウ | 25～35 kg/10a | は種前又は<br>定植前 | 1回      | 全面土壌<br>混和 |                  |
|      | ミナミキロアサミマ             | 1～2.5g/株     | 育苗期          |         | 株元処理       |                  |
|      | アブラムシ類                | 1.5～2.5g/株   |              |         |            |                  |