

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成27年7月8日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第 17400 号	ガゼット粒剤	カルボスルファン粒剤	日産化学工業(株)
第 20794 号	FMC ガゼット粒剤	カルボスルファン粒剤	エフエムシー・ケミカルズ(株)
第 21046 号	石原ガゼット粒剤	カルボスルファン粒剤	石原バイオサイエンス(株)
第 23446 号	ISK ガゼット粒剤	カルボスルファン粒剤	石原産業(株)

■変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ） 】

作物名「なす」、「きゅうり」、「すいか」、「とうがん」、「だいこん」、「キャベツ」、「はくさい」、「ねぎ」、「ブロッコリー」、「ばれいしょ」、「かんしょ」、「いちご」、「メロン」を削除する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルボスルファンを含む農薬の総使用回数
なす	ミカンキイロアザミウマ	2g/株	定植時	1回	株元散布	1回
	アブラムシ類	1～2g/株			育苗期後半	
	ミナミキイロアザミウマ	1g/株	定植時		定植時： 株元散布又は 植穴土壌混和	
きゅうり	アブラムシ類	1～2g/株	定植時		植穴土壌混和	
すいか		1g/株	育苗期後半		播溝土壌混和	
とうがん	ミナミキイロアザミウマ	2g/株	定植時		2回以内	
だいこん	キジノミハムシ	3～6kg/10a	は種時			
		6kg/10a	は種覆土後			
キャベツ	コカガ	2g/株 (6kg/10a)	生育初期 但し、収穫45日 前まで	2回以内	株元散布	4回以内 (マイクロカプセル剤は 2回以内、粒剤は 2回以内(定植時は 1回以内))
		アオムシ アブラムシ類	1～2g/株 (3～6kg/10a)		育苗期後半	
	定植時			1回	定植時： 株元散布又は 植穴土壌混和	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルボスルファンを含む農薬の総使用回数	
はくさい	コナガ	1～2g/株 (3～6kg/10a)	定植時	1回	育苗期後半： 株元散布 定植時： 株元散布又は 植穴土壌混和	1回	
	アブラムシ類	2g/株 (6kg/10a)	定植時				
		1～2g/株 (3～6kg/10a)	育苗期後半				
	ねぎ	ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	3～6kg/10a				は種時
定植時							
ネギコガ		6kg/10a		定植時	1回	植溝土壌混和	
				生育期 但し、収穫45 日前まで	2回 以内	株元散布	
ブロッコリー	コナガ	1～2g/株 (3～6kg/10a)	定植時	1回	株元散布又は 植穴土壌混和	1回	
			育苗期後半		株元散布		
ばれいしょ	ナストビハムシ	6kg/10a	植付時	4回 以内	植溝土壌混和	4回以内 (植付時の土壌混 和は1回以内)	
かんしょ	アリモトキゾウムシ イモゾウムシ		9kg/10a		生育期 但し、収穫45 日前まで		株元散布
	ハリガネムシ		6～9kg/10a		植付時		植溝土壌混和
いちご	コガネムシ類幼虫	0.4～0.75g/株 (6～9kg/10a)		仮植床植付時	1回	全面土壌混和	1回
	アブラムシ類		本圃定植時	株元散布又は 植穴土壌混和			
	キンケチアブトゾウムシ幼虫		2g/株	株元散布			
メロン	アブラムシ類 ミナミキアザミウマ	1～2g/株	定植時	1回	育苗期後半： 株元散布 定植時： 株元散布又は 植穴土壌混和	1回	
		1g/株	育苗期後半				

[変更後]

削除

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は1日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。